



100 napos étkezési napló



100 napos étkezési napló

Az ételintolerancia kezelése kizárólag diétával lehetséges, melynek alapja a pozitív tartományba került élelmiszerek eliminálása, mellőzése az étrendből. Ételtoleranciában a tünetek, a panaszt kiváltó ételmszter elfogyasztása után, akár 3-5 nap múlva is jelentkezhetnek. A táplálkozási napló vezetése megkönnyíti diétás étrendjének összeállítását és nyomon követését. Fontos, hogy feljegyezze étkezéssel kapcsolatos tapasztalatait, tüneteinek alakulását. Feljegyzéseit átnézve könnyebb megtalálnia a panaszt okozó ételmszert. Az ételek neve mellé írja oda a felhasznált helyettesítő alapanyagokat pl: rizstej, kókusztej, zabtejszín, kukoricaliszt, rizsliszt, Szafi Free világos, puha kenyér lisztkeverék, Violife sajt, gluténmentes zsemle stb. Ha céltudatosan előre összeállítja étrendjét, gyorsabban be tudja szerezni a helyettesítő élelmiszereket is. Feltétlenül célszerű vezetni a táplálkozási naplót a diéta első másfél hónapjában. Az eliminációs diéta tartása nem könnyű feladat, ezért kezdetben segítség, ha napokra előre összeállítja étrendjét.

A napló vezetésének a pozitív élelmiszerek fokozatos visszaépítése során is hasznát veszi. Feljegyzései alapján kiszűrhető, mely élelmiszereket tolerálja ismét a szervezete, melyek azok az élelmiszerek, amelyek eliminációja még hosszabb ideig szükséges.



Személyi adatok

Név:

Testtömeg: Testmagasság:

FOODTEST vizsgálat dátuma:

Dietetikusom / táplálkozási tanácsadóm

Neve: Telefonszáma: Rendelésiideje:

Kerülendő (eliminálandó) élelmiszerek listája:

Határesetbe került élelmiszerek listája:

Diétás étrend kezdete:

Főbb panaszok:

Lakóhelyem közelében található diétás termékeket árusító üzletek listája:

Ezekon az oldalakon, az Ön által fogyasztott diétás étrendet és annak hatásait rögzítheti.

Dátum: 2016.12.12.

Reggeli: 1
Tízórai: 2
Ebéd: 3
Uzsonna: 4
Vacsora: 5

.....
Hétfő
1: kókuszital, linco light marg., szalámi, jégsaláta, (gm) kenyér
2: banán
3: zöldségleves (rté), grillezett csirke, zöldbabfőzelék (kl), alma
4: Alpro mandulás joghurt, (gm) puffasztott rizskeksz
5: pizstráng roston, őszibarackkal (gm liszt), burgonya püré (rtej)

(A táblázat kitöltéséhez három nap példát mutatunk.)

.....
Kedd

Diétás étrendem: pl. tejfehérje-, tojásfehérje-, gluténmentes (gm)


1: tea, tejberizs (ktej)
2: csokoládés szójaital, sonka, paprika, (gm) abonett
3: karfolleves (szl, rizsfőzőkrém), rántott szelet (ts, gm zs.morzsa), párolt s.répa, amarant köret
4: narancslé, füstölt tofu, paradicsom
5: natúr pulykamell, lecsó, puliszka (kukoricadara), egy pohár fehér bor

Kitöltéskor az alábbi rövidítéseket használja:

Gluténmentes: gm
Rizstészta: rté
Rizstej: rtej
Rizsliszt: rl
Kukoricaliszt: kl
Kókusztej: ktej
Szojaliszt: szl
Tojássárga: ts
Mandulaliszt: ml

.....
Szerda
1: tea, tojásrántotta (ts, rtej), (gm) kifli, kaliforniai paprika
2: virsli (gm), rizshamlett, mustár
3: gulyásleves, almás lepény (rl, mandulaliszt, ts, liga marg.)
4: ciráta (cirokgolyó gm) narancs
5: vitamin saláta, violife sajt, hideg sült, (gm) kenyér

Az egészséges táplálkozás piramisa



Észrevételek, tünetek:

A 100 napos diéta alatt észlelt tüneteit, tapasztalatait ide jegyezze fel!

1.hét:

.....

2.hét:

.....

3.hét:

.....

4.hét:

.....

5.hét:

.....

6.hét:

.....

7.hét:

.....

8.hét:

9.hét:

10.hét:

11.hét:

12.hét:

13.hét:

14.hét:

15.hét:

1. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Fogadja pozitívan étrendje megváltoztatását. Valószínű, hogy megtalálta régóta fennálló, eddig kiderítetlen panaszainak kiváltó okát. Az eliminációs étrend hatására napról-napra jobban érezheti magát. Jegyezze fel az étrendi naplóba, mely élelmiszerekre, alapanyagokra intoleráns. Az étkezési napló vezetése arra szolgál, hogy folyamatosan rögzítse tüneteinek alakulását és nyomon kövesse az eliminációs étrend hatását.

Tipp:

A 38. oldalon lévő táblázatban egyszerűen tudja értékelni az eliminációs diétájának hatásait.

2. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:


3:

4:

5:



Nagyon fontos **az Ön ételintolerancia leletének megfelelő értelmezése**. Étrendje megváltoztatása előtt keressen fel egy dietetikust, táplálkozási tanácsadót, gastroenterológust és/vagy allergológust. Segítségükkel eligazodhat az alternatív élelmiszerek bőséges választékában. **Szakemberek irányításával**, az Ön igényeinek leginkább megfelelő helyettesítő élelmiszereket tudja kiválasztani és elkerülheti a hiányállapotok kialakulását. **Az ételintolerancia lelet eredményétől függetlenül a korábban orvos által elrendelt diétát továbbra is tartania kell**. Olvassa el Táplálkozási Tanácsadó Jegyzetünket!



3. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Az eliminációs étrend bonyolultnak tűnhet, de **az étrend előre történő megtervezésével** rövid időn belül **gyakorlattá válhat**. Állítson össze egy listát, melyek azok az ételek, melyeket nagyon szeret. Látni fogja, hogy számos étel továbbra is minden átalakítás nélkül fogyasztható. A helyettesítő alapanyagokkal való ételkészítést először a könnyebben elkészíthető ételekkel kezdje. A növényi eredetű tejhelyettesítő termékek, pszeudocereáliák a főzés során másképp viselkednek. Ezt megtapasztalva fokozatosan jusson el a bonyolultabb ételek elkészítéséhez. **Ne keseredjen el**, ha először valami nem úgy sikerül, mint ahogy szeretné. **Legközelebb már könnyedén elkészíti ugyanazt a receptet**. Az alternatív alapanyagok beszerzéséhez keressen fel táplálékallergia szakboltot, illetve a webáruházak kínálatából is kényelmesen vásárolhat.

Fontos, hogy az eliminációs diéta során is változatosan étkezzen és ízletes ételeket fogyasszon. A Szafi Free termékcsalád a glutén-, tej-, tojás-, szója-, élesztő- és olajos magvakra érzékenyek számára is megoldást kínál, termékei segítségével különböző kenyerek, péksütemények, édes és sós sütemények, nokedli, palacsinta, és még sok más finomság elkészíthető. A termékekhez kifejlesztett receptekkel nagyon egyszerűen készítheti el a kedvenc ételeit, a diétájába is beilleszthető módon. Kipróbálhatja a Hadarik Rita és a WisePasta lisztkeverékeit és gluténmentes tésztaíit.

Javasolt dietetikust, táplálkozási tanácsadót, gastroenterológust, allergológust felkeresni, aki az Ön segítségére lehet kérdéseivel kapcsolatban.



4. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

A leggyakoribb ételintoleranciát okozó élelmiszer a **tehéntej – tejjefehérje**, ebben az esetben **növényi eredetű készítmények** fogyasztása javasolt. Az étrendnek ebben az esetben is biztosítania kell a **megfelelő kalcium bevitelt**. A kalcium hasznosulását az étrend fehérje és D-vitamin tartalma is befolyásolja. A növényi eredetű tejhelyettesítő termékek bőséges kínálatából a kalciummal dúsítottakat válassza!

Hasznos tanács:

Az olajos magvak, mák, szárazhüvelyesek, szójatermékek, banán, birsalma, narancs, apró magvas gyümölcsök, füge, zabpehely, sóska, paraj, sárgarépa, gomba, szardínia gyakoribb fogyasztásával emelheti étrendje kalcium tartalmát. Bizonyos esetekben az élelmiszerek által elfogyasztott kalcium nem elegendő, szükségessé válik a kalcium szupplementáció (kiegészítés, pótlás). Étrendje megváltoztatása előtt keresse fel orvosát, gasztroenterológusát vagy dietetikusát.



5. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Búzafehérje intolerancia esetén a reakciót kiváltó komponens nem a glutén, hanem az alfa –amiláz- inhibitor, tripszinhinhibitor. Az IgG mérésen alapuló búzafehérje ételintolerancia nem keverendő össze az autoimmun eredetű cöliákiával, sem a búzaallergiával (IgE szint mérése). Búza intolerancia esetén is alternatívát kínálnak a gluténmentes termékek, de a búzamentes étrend nem feltétlenül egyezik meg a gluténmentes étrenddel.

Figyelni kell a következőre: a gluténmentes búzakeményítő tartalmazhatja azt a fehérje összetevőt, melyre Ön érzékeny, így ezeket a termékeket kerülje. Bevásárlásnál tanulmányozza az ételismiszcímjét, a **búzamentes (wheat free)** termékeket keresse.



6. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

*Szeretne étteremben diétájának megfelelően, felhőtlenül elfogyasztani egy finom vacsorát? Étrendjének összeállítását, az alternatív élelmiszerek beszerzését biztonságossá és egyben könnyebbé teszi, hogy **jogszabály teszi kötelezővé az allergénjelölést az élelmiszereken, illetve a közétkeztetésben és a vendéglátás területén is.** Az ételintolerancia nem azonos az IgE mediált táplálék allergiával. Kezelésük azonban azonos, a reakciót kiváltó élelmiszerek kizárásán alapul. Jelölés köteles allergének többek közt: glutén, tojás, halak, szójabab, tej, diófélék, zeller, mustár és az abból készült termékek. Az interneten keresztül tájékozódhat a speciális igényeket is kielégítő és megbízható éttermekről, ételkiszállító cégekről.*



7. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Nagyon sok pozitív eredmény esetén a kiemelkedően magas élelmiszerek eliminációja javasolt. Ezekben az esetekben a megfelelő helyettesítő élelmiszerek kiválasztása is nehezebb. Keressen fel dietetikust vagy táplálkozási tanácsadót, aki segít eligazodni az étrenddel kapcsolatban.



8. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:



Az eliminációs étrendet legalább hat hónapig javasolt tartani. Mint minden étrendi változtatás, az ételintolerancia diéta is nehéz, sok lemondással jár. 4–6 hét elteltével, a provokáló ételmiszer elhagyása következtében már tapasztalnia kell a pozitív változásokat. A diéta hatékonysága esetén legyen kitartó és továbbra is az intoleranciát elkerülő szempontok szerint étkezzon.

9. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Önnél is kimutatta az ételintolerancia vizsgálat a **tojásfehérje érzékenységet**? Ha a tojássárgája negatív maradt, elegendő a tojásfehérje eliminációja. Ne tévessze össze a tojásallergiával (IgE ételallergia). **A két komponens egyszerű szétválasztása - csak a tojásfehérje mellőzése- ételintolerancia esetén megfelelő megoldás.** Ez nagy segítséget jelent az ételkészítés során. Tojás helyettesítésére használhat tojáspótló port, gyümölcspürét, paradicsompürét, olajat, nyers reszelt burgonyát, szóдавízet, olyan lisztkeverékeket, amelyekhez nem szükséges tojást adni, mégis elkészíthetők belőle a kedvenc édes és sós süteményeink, palacsinta, nokedli, stb. Ilyen például a Szafi Free termékcsalád. A lenmag, chiamag, útifűmaghéj megfelelően kezelve kiváló kötőanyagként viselkedik ételkészítés során. Szükség esetén kérje dietetikus vagy táplálkozási tanácsadó segítségét, aki ételkészítéssel kapcsolatos kérdéseit is megválaszolja.



10. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

A diéta ideje alatt - különösen, ha tejfehérje, tojásfehérje mentes étrendet tart - könnyen fehérjehiányos állapotba kerülhet. Vegyes táplálkozás és egészséges felnőttek számára 0,8-1 g/ttkg napi fehérjebevitel javasolt. A fehérje szükséglet az egyes életkorokban jelentősen eltérő. A fehérjék biológiai értékét esszenciális aminosav tartalmuk határozza meg. Az elsőrendű vagy komplett fehérjék valamennyi esszenciális aminosavat a megfelelő mennyiségben tartalmazzák, és így egyedüli fehérje forrásként is kielégítőek.

Ide tartozik az állati eredetű fehérjék nagy része (tojás, tej, húsfélék, hal). Tejfehérje, tojásfehérje mentes diéta esetén figyeljen arra, hogy a három főétkezés tartalmazzon elsőrendű fehérjét: húсок, halak, belsek, tenger gyümölcsei, tojássárgája. A növényi fehérjék, mint a szárazhüvelyesek, borsó, olajos magvak, rizs, burgonya, egymással, vagy más fehérje forrással együtt fogyasztva hozzájárulnak a megfelelő fehérjebevitelhez.



11. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:


4:

5:

Ne ijedjen meg, **a gliadin ételintolerancia, nem azonos a cöliákiával** (lisztérzékenység). Ebben az esetben gluténmentes élelmiszerek fogyasztása javasolt. Kiemelkedően magas gliadin ételintolerancia érték esetén a cöliákia irányába történő további laboratóriumi vizsgálat szükséges.

Keressen fel dietetikust, táplálkozási tanácsadót, gasztroenterológust vagy allergológust, aki az Ön segítségére lesz a további vizsgálatokkal kapcsolatban.

Gliadin érzékenység esetén esetleges negatív érték ellenére is **kerülendő: búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza, kamutbúza, durumbúza, továbbá ezen lisztek, őrleményeik és pelyhesített változataik**. Gliadin érzékenység esetén a következő helyettesítő élelmiszerek használata javasolt: kukorica, rizs, szója, hajdina, köles, quinoa, amarantmag, sárgaborsó, csicseriborsó, kókusz, mandula, gesztenye, útifűmaghéj, tapióka, cirok lisztek. A búza helyettesítésére használt álgabonák kedvező összetételben tartalmaznak vitaminokat (B, C, E) és ásványi anyagokat (kálium, kalcium, magnézium, foszfor, vas). A hajdina, köles, quinoa, amarantmag sós és édes ízű ételként a rizshez hasonlóan készíthető el. **Merjen kipróbálni új recepteket, gazdagítsa receptúráját!**



12. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

A diéta ellenére törekedjen a rendszeres, változatos, magas tápanyag tartalmú, szezonális alapanyagokból, házilig elkészített ételek fogyasztására. A házilig elkészített ételek fogyasztása javasolt **agar agar (E406)** érzékenység esetén is. Ezt a zselésítő kötőanyagot aszpikos készítmények, cukrászsütemények, aszpikos felvágottak, lekvárok, joghurtok tartalmazzák. **Szója érzékenység** estén is a házilig készült ételek fogyasztása ajánlott, mindazok mellett, hogy kerülje pl. szójakocka, szójaszószt fogyasztását. A **mustármagot** is gyakran megtaláljuk a felvágottak, savanyúságok ízesítőjeként. Az élelmiszercímke tájékoztat az összetételről. A finom sült, házi májkrém vagy húskrém egészségesebb és a családjában is nagyobb örömet szerez.



13. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:



Étrendje megváltoztatásával egyidejűleg az egészségi állapotát javítja a rendszeres testmozgás is. Fizikai aktivitását fokozhatja kezdetben egy rövid séta, kocogás beiktatása, lift helyett lépcső használata, könnyű torna vagy szobakerékpározás – fontos, hogy ezek a változtatások mindennapja részévé váljanak. A testmozgás bevezetése vagy már gyakorlása során vegye figyelembe saját edzettségi állapotát és terhelhetőségét. A hetente 3-5 alkalommal, legalább harminc percig végzett közepes intenzitású fizikai aktivitás preventív hatású a civilizációs betegségekkel szemben. Az állóképesség növekedése mellett a sport örömkeltő funkciójáról se feledkezzünk meg. A fizikai aktivitás során boldogság hormonok szabadulnak fel a szervezetben, amelyek eufórikus örömet váltanak ki. A mozgás hosszú távú hatásaként növekszik a stressztűrő képesség, a nagyobb önbizalom birtokában könnyebbé válik a feladatok megoldása. A rendszeres mozgást végzők motiválhatóbbak, munkájuk során is terhelhetőbbek. A mozgás során a flow élmény – optimális élmény megtapasztalása segít a nehezebb élethelyzetekben, így az eliminációs étrend nehézségein is átlendülni.

14. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Szomjoltásra legalkalmasabb az ivóvíz. Fogyasszon naponta 10-12 pohár folyadékot (1 pohár = 2-2,5 dl). Leginkább vizet vagy ízesítetlen teát. Cukortartalmú teákat, üdítőitalokat csak a folyadékbevitel színesítésére, alkalmanként, kis mennyiségben igyon. Frissen facsart gyümölcs-, zöldséglé, levesek fogyasztása üdítően hat szervezetére. Naponta 2,5-3 liter folyadék bevitel javasolt. A gyorséttermi ételek gyakori fogyasztása kedvezőtlenebb a vízigény kielégítése szempontjából, szemben a zöldségeket, gyümölcsöket nagyobb mennyiségben tartalmazó étrendnél.



15. hét

Csütörtök

1:

2:

3:

4:

5:

Dátum:

Hétfő

1:

2:

3:

4:

5:

Kedd

1:

2:

3:

4:

5:

Szerda

1:

2:

3:

4:

5:

Péntek

1:

2:

3:

4:

5:

Szombat

1:

2:

3:

4:

5:

Vasárnap

1:

2:

3:

4:

5:

Étkezési naplójának utolsó hetéhez érkeve tünetei valószínűleg sokat enyhültek vagy teljesen megszűntek. Reméljük, minden nehézség ellenére igazi kulináris élvezetekben volt része. Örülünk, hogy idáig eljutott, gratulálunk kitartásához! Eliminációs étrendje most a visszaépítés szakaszába jutott. Ha diétáját hat hónapja tartja, megkezdhető a pozitív értékű élelmiszerek visszaépítése. A reaktív élelmiszerek visszaépítésének fokozatosnak kell lennie. Nagy odafigyelést igényel az újból fogyasztott ételek és a tünetek alakulásának megítélése. Segítségére van, ha étrendi naplóját folyamatosan vezette, vissza tud lapozni, következtetéseket vonhat le a tünetek alakulásában. Az eliminált élelmiszerek közül először a legalacsonyabb pozitív értékű élelmiszerek visszaépítésével próbálkozzon, amelyeket főzve, sütve fogyasszon. Egyszerre egyfajta élelmiszert építsen vissza, kis ételadagok szerepeljenek étrendjében. A visszaépítés során tartson 3-5 nap szünetet és figyelje az esetlegesen jelentkező tüneteket. A visszaépítés ideje alatt is vezessen étkezési naplót! Jegyezze fel a bevezetett étel nevét, mennyiségét, bevezetésének idejét, esetleges hatásait! Tünetmentesség esetén az adott pozitív étel normál mennyiségben ismét fogyaszthatóvá válik. Az ételintolerancia kialakulásának lehetőségét csökkenti, ha étrendjét változatos alapanyagokból, a szezonalitást figyelembe véve állítja össze. Az alternatív alapanyagokat, amelyeket a diéta alatt szívesen fogyasztott és megszeretett, a továbbiakban is bátran fogyassza, változatosabbá téve étrendjét.



Vigyázzon egészségére! Számos betegség megelőzhető egészséges életmóddal. A kiegyensúlyozott étkezésen belül javasolt mindennap friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani. Az ajánlás napi 400 g zöldség és gyümölcs változatos fogyasztása.

Minden igyekezete ellenére ledöntheti lábáról néha egy kisebb-nagyobb betegség. Ha antibiotikum kezelésre van szüksége, ezek a készítmények, megbontva a bélrendszer baktériumflórájának egyensúlyát, emésztési zavarokat okozhatnak. A bélfal károsodása következtében kialakuló fokozott áteresztőképesség az ételintolerancia kialakulásának előzménye. Antibiotikum kezelés mellett fontos jó minőségű probiotikum készítmény alkalmazása. Diétája összeállításában segítséget nyújt Táplálkozási Tanácsadó jegyzetünk.

Elérhetőségek

📍 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 27.

☎ +36 1 424 0969

✉ info@foodtest.hu

🌐 www.foodtest.hu

Összeállította: Károlyiné Csicsely Katalin – dietetikus

2020 október

Minden harmadik ember ételérzékeny,
sokan mégsem tudnak
az ételintolerancia létezéséről

AZ ÉTELINTOLERANCIA
LEGYŐZHETŐ!

Tegye meg Ön is az első lépést,
jelentkezzen vizsgálatunkra!

 **FOODTEST.HU**
ételintolerancia központ

